

Očkovanie proti COVID – 19

Na vytvorenie dostatočnej ochrany očkovaním aktuálou očkovacou látkou sa musí vakcína podať dvakrát v intervale 3 týždňov. Vakcína je pre každého občana SR bezplatná.

Plnohodnotná ochrana proti ochoreniu COVID-19 začína 7 dní po 2. očkovaní. Podľa súčasného stavu vedomostí je asi 95 zo 100 zaočkovaných ľudí chránených pred ochorením. Ako dlho bude táto ochrana trvať, nie je v súčasnosti známe. Kedže ochrana nenastupuje okamžite po očkovani a nie je vyvinutá u všetkých zaočkovaných osôb, je nevyhnutné, aby ste napriek očkovaniu chránili seba a svoje okolie dodržiavaním pravidiel **až do 7 dní po 2.očkovani:**



- Noste správne rúško (zakrytý nos aj ústa).
- Dodržiavajte odstup od cudzích ľudí (približne 2 metre).
- Umývajte, či dezinfikujte si často a dôkladne ruky.
- Pravidelne vetrajte.

Pri každom lieku aj vakcíne sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky. Preto otvorené popisujeme pomer prínosov a rizík. Európska agentúra pre lieky schváli len vakcínu, ktorej benefity vysoko prevyšujú riziká.

Benefity:

- Osobný prospech pre očkovaného – je chránený pred ochorením a nemôže infikovať rodinu a okolie.
- Preočkovanie väčšiny populácie ušetrí potenciálne tisíce životov len na Slovensku.
- Odbremeníme nemocnice od tisícov hospitalizovaných ľudí na Covid – 19.
- Predídeme množstvu prípadov dlhodobých následkov po prekonaní ochorenia.
- Umožní nám návrat k normálnemu životu.

Riziká:

- Mierne nežiaduce účinky ako bolesti v mieste vpichu, bolesť svalov, zvýšená teplota, alebo únava sa môžu vyskytovať relatívne bežne. Sú to predvídateľné reakcie, ktoré sú nezávažné a spôsobia maximálne krátke nepohodlie.
- Závažné nežiaduce účinky sú prísne sledované počas klinického testovania a ich zriedkavosť je základným predpokladom pre to, aby bola vakcína schválená. Veľmi zriedkavé nežiaduce účinky (výskyt menej ako 1/10 000 osôb) nemuseli byť ešte doteraz zachytené. Ak by ste pocíťovali silné nežiaduce účinky, hlásenie môžete podať písomne, cez webový formulár alebo telefonicky. Pokyny na hlásenia podozrení na nežiaduce účinky vakcín sú dostupné na:
<https://portal.sukl.sk/eskadra/?act=EskadraMain&mId=1>
- Dlhodobé nežiaduce účinky sa podľa doterajšej skúsenosti pri iných vakcínach schválených Európskou liekovou agentúrou nevyskytli

Kto by nemal byť očkovaný?

Očkovaní budú ľudia vo veku od 18 rokov. Zatiaľ nie sú dostatočné skúsenosti s očkovaním počas tehotenstva a dojčenia. Podanie očkovacej látky sa má zvažovať, len v prípade, ak možné prínosy prevažujú nad akýmkoľvek rizikami pre matku a plod. Každý, kto trpi akútym ochorením so zvýšenou telesnou teplotou by mal byť očkovaný až po uzdravení. Mierne prejavy prechladnutia bez zvýšenej teploty nie sú dôvodom na odloženie očkovania. V prípade precitlivenosti/alergii na niektorú zložku očkovacej látky, nemali by ste byť očkovaný; ak máte alergie, informujte prosím vášho lekára pred očkovaním. Je nutná zvýšená opatrnosť pri vakcinácii u ľudí užívajúcich lieky na riedenie krvi, so zníženým počtom krvných doštíčiek alebo s poruchou zrážania krvi. Osobám, u ktorých po prvej dávke vakcíny vznikla anafylaxia (extrémne silná alergická reakcia), sa nemá podať druhá dávka vakcíny.

Spracované a doplnené podľa materiálu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a MZ SR.

Na základe všetkých dostupných informácií odporúčame absolvovať očkovanie proti COVID – 19.